

## LAMIVUDINA®

### LAMIVUDINA



#### ¿Qué es LAMIVUDINA®?

Es un medicamento antiviral que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento de la Hepatitis B crónica para mantener la carga viral suprimida.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

La dosis recomendada es de **1 comprimido** una vez al día.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar LAMIVUDINA®?

Tome el comprimido por vía oral una vez al día CON O SIN ALIMENTOS, aproximadamente a la misma hora cada día.

Los comprimidos se deben tragar enteros con un vaso de agua, no debe masticarlos, triturarlos ni partírllos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Si han pasado menos de 12 horas** desde la hora prevista de la toma, tómela en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. **Si han pasado más de 12 horas**, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si **vomita antes de treinta minutos** tras haber tomado el comprimido, debe tomar otro comprimido. Si vomita después de treinta minutos, no es necesario que tome otra dosis.

#### ¿Cuándo no debo tomar LAMIVUDINA®?

- Si es alérgico a LAMIVUDINA o alguno de sus excipientes (almidón de patata).
- Si está embarazada o cree que pudiera estarlo.
- La lactancia materna está contraindicada durante el tratamiento.

#### Precauciones

- Utilice medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento.
- No deje de tomar LAMIVUDINA sin consultar a su médico, ya que su hepatitis puede empeorar al interrumpir el tratamiento.
- Conducción, uso de maquinaria, LAMIVUDINA puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con LAMIVUDINA® son:

- Trimetoprim/sulfametoxazol, antibiótico utilizado para tratar infecciones.
- Cladribina
- Evite tomar medicamentos que contengan sorbitol.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Aumento de las transaminasas hepáticas**
- Erupción, prurito

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, garganta.
- Respiración profunda y rápida, acompañada de somnolencia náuseas, vómitos.
- Dolor articular, rigidez articular y dificultad para moverse.

## ¿Cómo debo conservar LAMIVUDINA®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa