



## DUPIXENT® DUPILUMAB

### ¿Qué dosis se debe administrar?

La dosis habitual recomendada para el tratamiento del prurigo nodular en adultos es:

**Dosis inicial: 600 mg** (2 inyecciones de 300 mg).

**Dosis siguientes: 300 mg** cada 2 semanas.

### ¿Cómo se debe administrar DUPIXENT® (DUPILUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea (bajo la piel).

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.



Para evitar molestias en el lugar de inyección, se recomienda sacar la pluma de la nevera al menos 30 minutos antes de la inyección.

Cada pluma contiene una única dosis y no puede ser reutilizada.

### Instrucciones para la administración

- Lávese las manos y limpie la zona de inyección con alcohol.
- Retire el capuchón de la pluma.
- En un ángulo de 90°, presione la pluma contra la zona de inyección de su cuerpo, escuchará un clic; en este momento habrá empezado la inyección.
- Mantenga la pluma firmemente presionando durante 15 segundos. Oirá un segundo clic, esto indica que la inyección ha terminado. El émbolo verde ocupará la ventana de visión por completo.
- Levante la pluma verticalmente hacia arriba, el protector de la aguja se deslizará hacia abajo y cubrirá la aguja.
- Deposite la pluma en un contenedor para objetos punzantes.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis, adminístresela lo antes posible, y deberá administrarse las siguientes dosis según el calendario que tenga establecido.

**Si han pasado más de 7 días desde la dosis olvidada**, póngase la dosis omitida y a partir de esa fecha, póngase la siguiente a las dos semanas.

No interrumpa el tratamiento con DUPIXENT® (DUPILUMAB) a menos que su médico se lo recomiende.

### ¿Cuándo no se debe administrar DUPIXENT® (DUPILUMAB)?

- Si tiene alergia a DUPILUMAB o a alguno de los excipientes

## Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
- Infecciones parasitarias, si tiene una infección parasitaria, vive en una zona o viaja a un lugar donde son frecuentes las infecciones por parásitos, consulte con su médico o farmacéutico. Este medicamento puede disminuir la capacidad para combatir algunas infecciones parasitarias.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

DUPIUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento, no se han descrito interacciones relevantes entre DUPIXENT® y otros medicamentos.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?


Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- Reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor).
- Conjuntivitis.
- Herpes en los labios o en la piel
- Dolor en las articulaciones (artralgia).

### **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave, que se manifiesta con, erupción cutánea, habones, hinchazón de la cara, lengua o boca y/o dificultad para respirar.
- Si presenta una combinación de síntomas que incluye una enfermedad similar a la gripe, hormigueo o entumecimiento de los brazos o piernas, empeoramiento de los síntomas pulmonares y/o erupción.

## ¿Cómo debo conservar DUPIXENT® (DUPILUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera (2°-8°C), nunca en el congelador.
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Los envases pueden desecharse en el punto SIGRE  de las oficinas de farmacia comunitarias o en Servicio de Farmacia del Hospital.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa