



OCREVUS® OCRELIZUMAB

¿Qué es OCREVUS® (OCRELIZUMAB)?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente y la esclerosis múltiple primaria progresiva. Este medicamento no cura la enfermedad, pero ayuda a evitar las recaídas, y hacerlas menos graves y con ello frenar la progresión y los efectos de la enfermedad.

¿Qué dosis se debe administrar?

La dosis inicial recomendada es de **600 mg en administrada en dos veces**. Una primera perfusión de 300 mg y una segunda perfusión de 300 mg, **dos semanas más tarde**.

Las dosis posteriores se administrarán en **dosis única de 600 mg cada 6 meses**.

¿Cómo se debe administrar OCREVUS® (OCRELIZUMAB)?

La dosis se administra por perfusión intravenosa (mediante un gotero en una vena), normalmente en el brazo.

La administración de las dosis iniciales requiere aproximadamente 2,5 horas. Las dosis posteriores se administrarán aproximadamente en 2 o 3,5 horas.

La administración debe ser realizada por un profesional sanitario.

Antes de administrar OCREVUS® se administrarán otros medicamentos para prevenir o reducir los efectos de la administración: un corticosteroide, un antihistamínico y en ocasiones un medicamento para la fiebre.

¿Qué hago si olvido o no puedo acudir a una cita para administrar una dosis?

Si no recibió una dosis de OCREVUS® (OCRELIZUMAB), hable con su médico para que se la administre lo antes posible. Se debe de mantener el intervalo de tratamiento de 6 meses (con un mínimo de 5 meses) entre cada dosis.

¿Cuándo no se debe administrar OCREVUS® (OCRELIZUMAB)?

- Si tiene alergia a OCRELIZUMAB, o a alguno de los excipientes.
- Si su sistema inmunitario tiene un problema grave, o está tomando medicamentos que afecten al sistema inmunitario.
- Si padece cáncer.
- Si padece alguna infección activa.

Precauciones

- Las mujeres en edad fértil, deberán utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento y durante 12 meses después de la última perfusión.
- Este medicamento puede ser utilizado durante la lactancia.
- Si ha padecido alguna vez hepatitis B o es portador del virus de la hepatitis B, OCREVUS® puede hacer que el virus de la hepatitis B vuelva a activarse.
- Se debe vigilar la aparición de síntomas de leucoencefalopatía multiforme progresiva y la aparición de infecciones.
- Durante el tratamiento con OCREVUS® no se deben recibir vacunas de virus vivos o vivos atenuados.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

OCREVUS® no se debe administrar junto con ciertos fármacos como inmunosupresores.

Los medicamentos para tratar la hipertensión arterial no se deben tomarse en las 12 horas anteriores a la administración, ya que OCREVUS® produce hipotensión.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Reacciones relacionadas con la perfusión (prurito, erupción cutánea, hipotensión, fatiga, dolor de cabeza, mareo)**
- **Infecciones de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, gripe.**
- Tos, catarro, sinusitis, bronquitis.
- Herpes oral, herpes zóster.
- Conjuntivitis.
- Gastroenteritis.

Avisé rápidamente a su médico si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos:

- Una reacción grave a la perfusión que se manifiesta con, erupción cutánea, habones, hinchazón de la cara, lengua o boca y/o dificultad para respirar, tensión arterial baja, mareo, latido cardiaco rápido.
- Síntomas de una infección grave como fiebre alta, escalofríos, tos persistente.
- Herpes zóster, aftas orales o úlceras genitales

¿Cómo debe conservarse OCREVUS® (OCRELIZUMAB)?

- El medicamento se debe conservar en nevera (2-8°)
- No congelar.
- La medicación debe mantenerse en su envase original para protegerla de la luz.
- Se recomienda utilizar el producto inmediatamente después de la dilución. De no ser así, la solución diluida debe conservarse entre 2 °C y 8 °C y ser administrada en un plazo máximo de 24 horas

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa