



WAKIX® 4,5 MG WAKIX® 18 MG PITOLISANT

¿Qué es WAKIX® (PITOLISANT)?

Es un medicamento utilizado como tratamiento de la narcolepsia con o sin cataplejía. La narcolepsia es un trastorno del sueño que se manifiesta con somnolencia diurna excesiva y ataques repentinos de sueño durante las horas del día.

¿Qué dosis debo tomar?

El tratamiento suele comenzar con una dosis de 9 mg en adultos y 4,5 mg en adolescentes y niños **una vez al día**, y se aumenta gradualmente o se reduce a lo largo de tres semanas hasta alcanzar la dosis más adecuada.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar WAKIX® (PITOLISANT)?

Tome el medicamento por vía oral, por la mañana con el desayuno.

No se debe tomar la dosis por la tarde, porque podría tener dificultades para dormir.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis, tome la siguiente a la hora habitual.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Cuándo no debo tomar WAKIX® (PITOLISANT)?

- Si es alérgico a PITOLISANT o alguno de sus excipientes.
- Si padece depresión grave.
- Durante la lactancia, debido a que PITOLISANT pasa a la leche materna.

Precauciones

- Si tiene antecedentes psiquiátricos como ansiedad o depresión graves.
- Si padece insuficiencia renal o hepática moderada.
- Si padece trastornos digestivos asociados a la secreción ácida.
- Si presenta obesidad grave o anorexia grave.
- Si padece epilepsia grave.
- Las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y al menos durante 21 días tras la interrupción del tratamiento. PITOLISANT puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales, por tanto, se debe utilizar otro método anticonceptivo seguro.
- Conducción y uso de máquinas o actividades que requieran una especial atención, PITOLISANT puede producir efectos adversos que disminuyan su capacidad de atención.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. En especial de los siguientes medicamentos:

- Antidepresivos como imipramina, clomipramina y mirtazapina, paroxetina, fluoxetina, venlafaxina, duloxetina.
- Antihistamínicos para tratar alergias.
- Antiepilépticos como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
- Quinidina, digoxina para tratar la arritmia.
- Rifampicina.
- Evite tomar Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- Dificultad para dormir, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, depresión.
- Dolor de cabeza, vértigo, pérdida de equilibrio, temblores.
- Náuseas, vómitos, indigestión.
- Cansancio

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave que se manifiesta con inflamación de labios, lengua o garganta, picazón intenso y generalizado, dificultad para respirar...
- Si se siente deprimido, tiene pensamientos extraños e ideas de suicidio.

¿Cómo debo conservar WAKIX® (PITOLISANT)?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa