

## SATIVEX®

### TETRAHIDROCANNABINOL/CANABIDIOL

#### ¿Qué es SATIVEX® (TETRAHIDROCANNABINOL/CANABIDIOL)?

SATIVEX® es un medicamento indicado para el tratamiento de la rigidez muscular (espasticidad) en pacientes con esclerosis múltiple.

#### ¿Qué dosis se debe administrar?

Es necesario un periodo de ajuste de la dosis para alcanzar la dosis óptima; se comienza con una pulverización y el número de pulverizaciones debe aumentarse cada día de acuerdo con las pautas proporcionadas por su médico. La dosis máxima son 12 pulverizaciones al día.

#### ¿Cómo se debe administrar SATIVEX®?

Se debe utilizar **solo por vía bucal**, pulverizar en la cara interna de la mejilla o debajo de la lengua. Es necesario agitar el envase antes de su uso.

Se puede usar con o sin alimentos. No obstante, el uso de SATIVEX® con alimentos puede afectar a la cantidad del medicamento absorbida por el organismo. En la medida de lo posible, intente administrárselo de la misma manera en relación con la comida, así siempre obtendrá el mismo efecto.

Las pulverizaciones deben distribuirse de forma uniforme a lo largo del día, entre la tarde/noche y la mañana. Siempre debe dejar transcurrir como mínimo **15 minutos entre cada pulverización**.

Las dosis de la tarde/noche deben administrarse entre las 16h y la hora de acostarse. Las dosis de la mañana deben administrarse entre la hora de levantarse y el mediodía.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis, aplique una pulverización lo antes posible. **No aplique 2 pulverizaciones** a la vez para compensar una dosis olvidada

#### ¿Cuándo no se debe administrar SATIVEX®?

- Si es alérgico a los extractos de cannabis o a alguno de los excipientes (etanol, propilenglicol).
- Si padece o tiene antecedentes familiares de enfermedad mental.
- Durante la lactancia

#### Precauciones

- Las mujeres en edad fértil y sus parejas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta al menos tres meses después de suspender el tratamiento.
- Conducción y manejo de máquinas, SATIVEX® puede hacer que algunas personas se sientan mareadas, si le ocurre esto o presenta otro efecto que afecte a su capacidad, no conduzca ni utilice máquinas.
- Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas junto con el tratamiento.
- Si padece enfermedad cardiovascular grave.
- Si tiene antecedentes de epilepsia.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

En concreto se debe tener especial cuidado con los siguientes medicamentos:

- Antibióticos como rifampicina o claritromicina. Antivirales como ritonavir.
- Antiepilépticos como fenobarbital, fenitoina, carbamazepina.
- Medicamentos para tratar infecciones por hongos como fluconazol, itraconazol...
- Medicamentos para reducir el colesterol como simvastatina o atorvastatina.
- Hipnóticos y sedantes ya que puede producirse un efecto aditivo en la sedación. Medicamentos anticonceptivos como etinilestradiol. Sativex puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales sistémicos, por lo que las mujeres que utilicen este tipo de anticonceptivos deben usar un método de barrera adicional.
- Anticoagulante oral (warfarina).
- Medicamento para los espasmos musculares (baclofeno).
- Medicamentos para el corazón como bisoprolol o propranolol.
- Hierba de San Juan (hipérico)

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Sensación de mareo o cansancio.**
- Problemas de memoria o concentración.
- Somnolencia, visión borrosa, dificultad en el habla.
- Aumento o pérdida de apetito, alteraciones en el gusto
- Estreñimiento o diarrea
- Náuseas o vómitos
- Trastornos bucales, (dolor, úlceras...)
- Malestar general, sensación de debilidad
- Pérdida de equilibrio o caídas

## **Avisé rápidamente a su médico si presenta los siguientes síntomas:**

- Alucinaciones, creencias de ideas falsas, pensamientos de suicidio, sensación de sobreexcitación o pérdida de contacto con la realidad.

## ¿Cómo debe conservarse LEMTRADA® (ALEMTUZUMAB)?

- Antes de su uso se debe conservar en nevera entre 2-8º en posición vertical. No congelar.
- Una vez abierto se debe conservar en posición vertical a temperatura inferior a 25º.
- Una vez abierto debe desecharse a los 42 días.
- La medicación debe mantenerse en su envase original para protegerla de la luz.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa