



## NUCALA® MEPOLIZUMAB

### ¿Qué es NUCALA® (MEPOLIZUMAB)?

Es un anticuerpo monoclonal humanizado utilizado para tratar el asma eosinofílica grave. Se usa junto con otros medicamentos en pacientes cuya asma es grave y no se ha controlado con otros tratamientos anteriores.

### ¿Qué dosis se debe administrar?

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 inyección de 100 mg cada 4 semanas.

Niños de 6 a 12 años: 1 inyección de 40 mg cada 4 semanas.

### ¿Cómo se debe administrar NUCALA® (MEPOLIZUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea (bajo la piel).

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, se recomienda sacar la pluma de la nevera al menos 30 minutos antes de la inyección.

Cada pluma contiene una única dosis y no puede ser reutilizada.

### Instrucciones para la administración

1. Lávese las manos y desinfecte el lugar de inyección con alcohol
2. Retire la tapa de la pluma. Coloque la pluma de manera que pueda ver el visor.
3. Presione firmemente la pluma contra la piel. La inyección comienza cuando se oye el primer "clic". Mantenga la pluma contra la piel, sin levantar. El indicador amarillo se moverá hacia abajo.
4. Oirá un segundo click, 15 segundos después del primer click, este indica que se ha inyectado todo el medicamento y la inyección ha terminado.
5. Compruebe la ventana de visión para asegurarse que todo el medicamento se ha inyectado, el indicador amarillo tiene que ocupar toda la ventana.
6. Retire la pluma y presione el punto de inyección con un algodón o gasa con alcohol.
7. Deseche la pluma utilizada.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis debe administrársela tan pronto como lo recuerde. Después, póngase en contacto con su médico o farmacéutico, para que le indiquen cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

Si no se da cuenta de que se ha olvidado una dosis hasta el momento en que le toca la siguiente, administre únicamente la siguiente dosis tal y como lo tenía planeado. No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

No interrumpa el tratamiento a menos que su médico se lo recomiende.

### ¿Cuándo no se debe administrar NUCALA® (MEPOLIZUMAB)?

- Si tiene alergia a MEPOLIZUMAB o a alguno de los excipientes

## Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
- Infecciones parasitarias, si tiene una infección parasitaria, vive en una zona o viaja a un lugar donde son frecuentes las infecciones por parásitos, consulte con su médico o farmacéutico. Este medicamento puede disminuir la capacidad para combatir algunas infecciones parasitarias.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

MEPOLIZUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento, no se han descrito interacciones relevantes entre NUCALA® y otros medicamentos.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Dolor de cabeza.**
- Reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor).
- Dolor de garganta, congestión nasal.
- Infección respiratoria cuyos síntomas pueden incluir tos y fiebre.
- Infección del tracto urinario.
- Dolor de espalda
- Eczema (manchas rojas en la piel que causan picor)

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, que se manifiesta con, erupción cutánea, habones, hinchazón de la cara, lengua o boca, mareo, desmayo y/o dificultad para respirar.

## ¿Cómo debo conservar NUCALA® (MEPOLIZUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera entre 2º-8ºC. Nunca en el congelador.
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- Se puede conservar en el embalaje exterior hasta un máximo de 7 días a temperatura ambiente (por debajo de 30ºC). Después de 7 días fuera de la nevera se debe desechar.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Los envases pueden desecharse en el punto SIGRE ☒ de las oficinas de farmacia comunitarias o en Servicio de Farmacia del Hospital.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa