

OMLYCLO® OMALIZUMAB



¿Qué es OMYCLO® (OMALIZUMAB)?

Es un anticuerpo monoclonal humanizado utilizado para prevenir que el asma empeore, controlando los síntomas del asma alérgica grave. Este medicamento también se utiliza para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea y la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, cuyos síntomas no se controlan con otros medicamentos.

¿Qué dosis se debe administrar?

Su médico determinará la dosis a administrar y la frecuencia de administración. La dosis varía en función de los niveles de Inmunoglobulina E (IgE) en su sangre y de su peso corporal.

La dosis puede estar entre 1 y 4 inyecciones al mismo tiempo (75-600mg).

Las inyecciones pueden administrarse cada 2 o 4 semanas.

¿Cómo se debe administrar OMYCLO® (OMALIZUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea (bajo la piel). La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, se recomienda sacar la jeringa de la nevera al menos 30 minutos antes de la inyección.



Instrucciones para la administración

1. Saque la pluma/jeringa de la nevera y déjela a temperatura ambiente (20 a 25°C) durante 30 minutos antes de administrarla. Observe el líquido a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro e incoloro. El lugar recomendado para la inyección es la parte anterior del muslo o la parte baja del abdomen. Si otra persona le administra la inyección, puede hacerlo en la parte superior del brazo. Para cada inyección elija un lugar diferente, separados al menos 3 cm del lugar donde se realizó la administración anterior.

2. Lávese las manos y limpie el lugar de la inyección con un algodón o toallita impregnada en alcohol.

Jeringa precargada

3. Quite el capuchón de la aguja tirando de él en línea recta.
4. Pellizque con suavidad la piel limpia para hacer un pliegue. Mantenga la jeringa precargada inclinada de 45 a 90° con respecto a la piel.
5. Con un movimiento rápido y corto empuje la aguja hasta que penetre por completo en la piel.

6. Empuje lentamente el émbolo para inyectar toda la solución de Omlyclo. Cuando la jeringa esté vacía, extraiga la aguja de la piel en el mismo ángulo en que la insertó.
7. Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.
8. Deseche la jeringa precargada usada en los contenedores especiales que se entregan para ello.

Pluma precargada

3. Retire la tapa de la aguja tirando en línea recta y deséchela. Estire con suavidad la piel limpia. Coloque la pluma precargada en un ángulo de aproximadamente 90 grados con respecto a la piel.
4. Empuje firmemente la pluma precargada hacia abajo en el lugar de la inyección para comenzar la inyección. El dispositivo hará clic cuando comience la inyección. Siga manteniendo la pluma precargada firmemente presionada sobre el lugar de la inyección.
5. El dispositivo hará clic por segunda vez. Después del segundo clic cuente lentamente hasta 15 para asegurarse de que la inyección se ha completado. Retire la pluma vacía de la piel.
6. Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis, debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello. No administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Después, póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente. No interrumpa el tratamiento con OMALIZUMAB a menos que su médico se lo recomiende.

¿Cuándo se debe administrar OMLYCLO® (OMALIZUMAB)?

- Si tiene alergia a OMALIZUMAB o a alguno de los componentes (látex)

Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
- Alergia al látex. La cápsula protectora de la aguja contiene un derivado de látex de caucho natural.
- Problemas de hígado o riñón.
- Infecciones parasitarias, si tiene una infección parasitaria, vive en una zona o viaja a un lugar donde son frecuentes las infecciones por parásitos, consulte con su médico o farmacéutico. Este medicamento puede disminuir la capacidad para combatir algunas infecciones parasitarias.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

OMALIZUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento, no se han descrito interacciones relevantes con otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?


Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Fiebre (en niños).**
- Dolor de cabeza.
- Sensación de mareo.
- Dolor en las articulaciones.
- Dolor en la parte superior del abdomen.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, que se manifiesta con, erupción cutánea, habones, hinchazón de la cara, lengua o boca, mareo, desmayo y/o dificultad para respirar.

¿Cómo debo conservar OMLYCLO® (OMALIZUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera (2°-8°C). Nunca en el congelador
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Los envases pueden desecharse en el punto SIGRE  de las oficinas de farmacia comunitarias o en Servicio de Farmacia del Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
 Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa